14 juin 1764.

Memoire

Sur quelques Particularités trouvées dans un Cadavre

Par M. guerin, ~~chir.~~ ~~en chef~~ de l'hotel dieu de Lyon.

Il entra dernierement à l'hotel-dieu de Lyon, un homme agé d'environ 40. ans, attaqué d'une maladie assés semblable à l'hydropisie, son ventre etoit extremement tendu, et il éprouvoit en conséquence les accidents qui accompagnent ordinairement cette maladie; lorsqu'on frappoit sur le ventre, l'on connoissoit au son qu'il y avoit de l'air, lorsqu'on pressoit les differentes régions de cette capacité, l'on sentoit une fluctuation manifeste, ce qui donna naissance à plusieurs contestations; l'incertitude ou l'on etoit fit qu'on ne se decida d'abord à aucune operation, l'on se contenta seulement de mettre en usage les remedes capables de combattre les simptômes présents, et peu de tems après le malade mourut.

Mr. Gassier l'un des chirurgiens de l'hotel dieu, fut préposé par Monsieur Guerin chirurgien Major dudit hopital pour faire l'ouverture du cadavre.

Il fit une incision cruciale par laquelle il coupa les tégúments et les muscles de l'abdomen, il voulut d'un même trait diviser le peritoine, mais à peine eut-il plongé le scalpel

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 57 n° 146

dans la Cavité, quil en sortit Beaucoup d'air et ensuite de l'eau en assés grande quantité; il acheva son incision, et ayant Renversé les quatre Lambeaux qui en Resultoient, la première Chose qui s'offrit a la vüe fut une membrane Particulière d'un tissu fort serré, de l'eppaiseur d'environ deux Lignes laquelle s'étendoit depuis l'appendice xiphoïde jusqu'au pubis, et par les Cotés elle etoit adherante a la portion du peritoine qui est Colée a la surface interne des Côtes; Plusieurs autres adhérances Particulière l'attachoient au diaphragme au foye et au mesentére. Cette membrane et la portion anterieure du peritoine Laissoient un intervalle en forme de poche dans lequel il se trouva un nombre infini d'hydatides grosses Comme des noisettes, d'une Couleur jeaunatre, fort transparentes, et pleines d'air elles etoient séparées les unes des autres, et flottoient dans l'eau qui s'y trouvoit Contenüe. Pour Continuer les Recherches il fallut ouvrir Cette membrane qui formoit la parois posterieure de la poche et qui Couvroit les intestins. L'on trouva que le petit Lôbe du foye excedant de beaucoup le volume ordinaire, occupoit presque tout l'hypochondre Gauche, tandis que la portion qui se trouve dans l'hypochondre droit, et qui par son volume naturel porte le nom de grand Lôbe, etoit d'un volume 8 fois plus petit que de Coutume. on n'appercevoit aucune Communication entre Ces deux Portions du foye, Ces deux lôbes paroissoient entiérement indépendants et séparés. Ce qui fit prendre dabord la portion du foye Contenue dans l'hypochondre Gauche pour le foye dans tout son entier, et l'autre portion Située dans

L'hypochondre droit. pour la ~~[illegible]~~ Rate. mais la destruction
Complette de la poche et un examen mieux Réfléchi, nous apprit
que les deux lobes formoient ensemble le foye, et qu'ils Communiquoient
par une sorte de bande formée par le foye meme, et qui
passoit derriere la poche dont j'ai parlé. je laisse le soin de
Comprendre que Cette structure du foye ne vient que de la présence
de Ce sac qui a eté un obstacle a L'accroissement du foye, et que
Celuy-cy gené a été obligé de se jetter partout où il trouvoit le
moins de Resistance, Comme du Côté Gauche. dans Cette
Conjecture, il faudra Convenir que Cette poche etoit ancienne, et
avoit lieu dans le moment même de la formation du foye, Car
Comment Concevoir que le foye une fois Conformé eut Cedé a L'effort
d'une poche qui d'ailleurs n'etoit Remplie que d'air et d'eau.

on passa ensuite a L'examen des autres visceres; L'estomac etoit
d'un volume Considerable. L'on apperçût deux hydatides blanches,
et plus grosses que des œufs ordinaires, dont L'ouverture laissa voir
dans Chacune d'elles, deux autres hydatides moins grosses et de la même
Couleur, Remplies d'une serosité Limpides; elles etoient suspendues
Chacune par une portion du mésocolon. dans la duplicature du
mésentère il s'en trouva une Beaucoup plus grosse abbreuvée de
La même Liqueur.

dans la Région hypogastrique L'on en trouva deux autres entre
Le Rectum et la vessie ayant Leurs adherances au méso Rectum.
Celles-cy etoient fort transparentes et Remplies d'une liqueur analogue
à Celle des autre. L'on découvrit aussi plusieurs obstructions dans les
Glandes du mésentère et dans la plûpart des visceres de L'abdomen.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE